

## Différences entre l'analyse des selles et la coloscopie

	Recherche de sang occulte (analyse des selles)	Examen visuel du côlon (coloscopie)
<b>Préparation à l'examen</b>	<p><b>Pour l'analyse chimique:</b> s'abstenir de certains aliments et médicaments</p> <p><b>Pour le test immunologique:</b> aucune préparation nécessaire</p>	<p>Prise d'un laxatif la veille et le jour de l'examen</p> <p>Abstention de certains aliments et médicaments</p>
<b>Réalisation</b>	<p><b>Par le patient:</b> prélèvement d'échantillons de selles d'une à trois défécations successives. Évaluation des échantillons de selles par un laboratoire, le médecin de famille ou la pharmacie</p>	<p>Par un gastro-entérologue en cabinet ou à l'hôpital</p>
<b>Fréquence</b>	Tous les deux ans	Tous les dix ans En présence de polypes: d'entente avec le médecin après quelques années
<b>Convient pour le diagnostic précoce chez ...</b>	... les personnes dès l'âge de 50 ans sans plaintes ni anomalies lors du test de risque ((Link zur Unterseite Prävention --> Risikochek))	... toutes les personnes, en particulier celles à haut risque ((Link zum Risikochek)): d'entente avec le médecin, souvent avant même l'âge de 50 ans
<b>Avantages</b>	Simple et rapide à réaliser	Des polypes peuvent être éliminés au cours de l'examen avant qu'ils n'évoluent en cancer. Permet de déceler même les polypes et tumeurs de petite taille.
<b>Inconvénients</b>	Risque de résultats faux-positifs et faux-négatifs Les résultats faux-positifs sont fréquents selon le test	Examen lourd (dans sa préparation et sa réalisation) Risque de complications (dans 1 à 2 coloscopies sur 1000)
<b>Prise en charge des coûts par l'assurance de base</b>	Sur prescription médicale, tous les deux ans chez les personnes de 50 à 69 ans; franchise et quote-part à la charge des patients	Tous les dix ans chez les personnes de 50 à 69 ans; franchise et quote-part à la charge des patients

Source: Ligue suisse contre le cancer